

喉
科
指
掌

喉科指掌叙

夫醫此為類。取繫其為道甚難。而于咽喉之科。剔次難也。難者此。咽喉。納食。喉。人。納。氣。納食。舌。為胃。腭。下。鋪。于。脾。經。

土化。絛氣者為肺。腕下通于
心。從食化。食性燥。其變動病
經。然則閉塞而不仁。故喉為病
謂此痺。土性濕。其變動病經
上則壅脹而不通。故咽病謂

此腫。治咽。喉者。夫。越。能。起。此。
節。至。其。證。也。虛。實。寒。熱。與。和。
紹。鑿。也。取。補。升。降。所。為。甜。樗。
于。毫。芒。折。衷。于。疑。似。者。指。聆。
音。切。脈。辨。氣。察。形。鮮。不。以。錄。

乘此差。成滯。當必判。跡或兢。
上慄。試探揣摩。恐不得當。
顧勢急而救之。以緩傷重。而
扶此。以輕。曰。循此。害其去。繆
戾幾何。故曰。難此難者也。吾

硯留僊張先生。素精醫理。其
云。咽喉。戈。科。冤。心。益。深。且。久。
採。緝。成。石。叅。以。足。見。條。例。詳。
細。裒。集。成。編。白。神。氣。脈。理。以。
及。色。心。青。紅。紫。白。音。心。高。下。

沉。浮。心。皆。寄。託。釋。瞭。然。指。
掌。較。答。列。眉。合。諸。所。治。心。症。
如。燈。取。影。百。無。一。失。真。濟。陀。
心。慈。航。拯。危。心。寶。筏。其。所。經。
驗。取。效。蓋。不。可。勝。紀。同。人。咸。

迹履付剗剗。俾遠近。習是
道者。派傳其說。發掬其蘊。其
功于世宙也。可可。經量。是
爲序。

乾隆丁丑春王二月

賜

進士及第浙江提督學院共
部左侍郎長洲彭啓豐芝庭
氏拜撰

喉科指掌總目

雲間世醫張宗良留仙氏著

男源一初校字

卷之一

咽喉大綱論

咽喉形名總訣

喉舌分經說

咽喉看滄法凡四條

左右脉訣圖

針穴圖

卷之二

精選應用方

十方

製藥法

門法

爰採應用方

十二方

卷之三

咽喉門

十一症圖說

簾珠喉

嗆食啞喉

內外腫喉

風熱喉

紫色虛喉

喉癰

喉疳

飛揚喉

虛啞喉

聲啞喉

爛沙喉

乳蛾門 七症圖說

雙乳蛾

單乳蛾

爛乳蛾

風寒乳蛾

白色乳蛾

伏寒乳蛾

石蛾

上卷終

卷之四

喉痺門 七症圖說

爛喉痺

白色喉痺

伏寒喉痺

雙喉痺

單喉痺

淡紅喉痺

走馬喉痺

喉風門 十二症圖說

內腫鎖喉風

外腫纏喉風

匝舌喉風

虛爛喉風

白色喉風

酒毒喉風

卷之五

喉癰門 十一圖說

勞碌喉風

酒寒喉風

腫爛喉風

肺寒喉風

辛苦喉風

淡紅喉風

伏寒喉癰

腫爛喉癰

淡白喉癰

大紅喉癰

聲啞喉癰

單喉癰

外症喉癰

兜腮喉癰

舌上癰

舌下癰

上腭癰

大舌門 十三症圖說

木舌

白腫舌

爛邊舌

紅點紫舌

純紫舌

座蓮花舌

重舌

蓮花舌

黃焦舌

舌上珠

舌下珠

左雀舌

右雀舌

卷之六

小舌門

五症圖說

胃大小舌

胃毒小舌

積熱小舌

純白小舌

懸旗小舌

雜喉門 七症圖說

松子喉疔

走馬牙疳

喉單

喉菌

喉瘤

左陰瘡

右陰瘡

風天 雙 瘡天

喉科指掌卷之一

雲間 世醫 張宗良 留仙氏著

男源一初校字

咽喉大綱論

夫咽喉者左爲咽右爲喉咽屬胃喉屬肺乃一身之總要
百節之關防呼吸出入之所也經云一陰一陽結而爲喉
痺痺者閉也有風有寒有火有熱有毒有虛或風火招傳
或寒濕相聚其症不一變幻不測故漫腫而痰多者風也

淡白而牙緊者風寒也。紫色不腫而爛者伏寒也。紅腫而脈浮者風火也。脈沉實爛而不腫者毒也。脈細數而浮者虛火也。細遲者虛寒也。風火寒濕毒虛皆類而推之可也。大凡初起之症，脰右寸洪緊者肺風也。兩關浮數者胃火。肝風也。左寸浮洪者心火也。右寸沉遲者遲伏寒也。沉數者伏熱也。右尺洪大者三焦火旺也。左尺洪而有力者腎虛火也。此數部脈者乃大略也。可總用六味湯加減治之。若凶險等症須脰其脈相其形再詳其受病之源細詰其

所起之端。而用藥對病。自然愈之速矣。故凡治咽喉之症。其要在於脈與形名耳。經云神聖功巧。不過望聞問切。以此推詳。庶無差悞。

[illegible]

喉舌分經說

喉有二孔左爲咽屬胃納食右爲喉屬肺納氣口內上腭

屬胃陰分下腭屬脾陽分舌之中心屬心四圍屬脾舌根亦屬

心經小舌名帝丁屬胃喉之左右通舌根者肝經外兩耳

垂下肝經舌白胎屬寒黃胎者屬熱如焦黃者熱甚黑者

熱之極凡舌胎不論黃焦黑以指摸之而滑有津者非其

熱也不可一味涼藥用八味丸引火歸源之法大舌邊紅

脾之火也可用清涼之劑喉之地位屬肝再進內寸許或

爛或腫俱屬脾火毒之症結毒者亦有之但兩關脈浮
者非結毒也沉者爲與此乃分經之大略若喉舌諸症另
後分形細查無謬

咽喉看治法總要 非十四

凡治毒症之法。須看其氣血壯盛者。多服涼藥。不妨如氣血衰弱者。涼藥不可多用。多則氣血愈衰。卽用十八味神藥爲安。

凡治喉中紅腫者。須視或癰或蛾。認症不真。不可下他藥。先用六味湯一服。吹金不換。然後查清加減可也。切不可輕易加減。急者先針患處。出血亦可。

凡帝王在咽喉當中。爲人一身之主宰。動刀針時。切宜防

明和抄等 卷之一
犯犯則血出不止。痼腫極難治也。

凡夜深看症。須得細照。再三推詳。如見症不真。不可輕用
刀針。亂投藥石。先服六味湯一帖。令患者漱吃。以俟天明
再看。

凡看症或病者。痛腫口不能開。吹藥不得者。灸頰車穴三
五壯。或用通關散吹鼻內。或煎水灌於鼻中。亦可。令病者
連連嚔。開口爲度。

凡外舌下兩邊青筋。血出鮮者。易治。成塊黑者。死。若瘀血

熱結於胸中。連服涼膈散。消痰解毒爲妙。

凡諸藥料。必須揀道地者。預脩俱爲細末。臨期急用。將白滾水泡一刻去渣。頻漱嚥下爲度。如煎不可多煎。數滾爲準。多煎則不效矣。

凡每年有時疫喉風。俗名鯁鯁瘟。兩腮腫脹。沿街遍巷。有一門傳染者。此症乃少陽經之患。用六味湯加蘇葉羌活牛蒡柴胡各一錢。服之可愈。如一門人多。用十服之料。煎一大鍋。每人分吃。

此針必須以銀打就細如大引針頭上一粒如菜子樣略
鑿一小缺有用針頭灸之法取其易放艾員耳
凡艾要陳者為妙員如小灸豆置於針頭缺處以香燃之
灸或多少不一看症之輕重耳此為針頭灸
凡喉鎗不可用鋼潤頭長大者近來病人多畏用手法况
喉間地步窄側如動手之時病者或搖頭退縮恐傷他處
必要或銅或金銀外打一小筒中藏利刃收放在手捺出
則鋒露收之則藏不傷別處矣

凡針身首四肢之穴。必用細針。惟十打五穴。可用三稜針。針之以血多爲妙。

凡看症若病者以舌疊起。則不見喉間矣。必須以物壓之。則舌不疊起。或或骨或牙或角皆可壓舌之具。

凡治應病方藥。必須依此分量。不可因藥味太重。以大黃等爲峻利。心生疑忌。不敢服之。余存心濟世。決不用重劑。誤人。古云有病則病當之。豈有害于患者哉。更不可輕聽人之言。反誤其事。情也。

十六絕症

舌捲囊縮

油汗如珠

啞喉噎食

吐血喉癰

聲如鋸錯

鼻塌唇青

脉細身涼

角弓反張

十指無血

喉乾無痰

六脉沉細

大便不通

天柱倒折

兩目直視

壅痰氣塞

喉菌不治

又四絕症

走馬喉風

鎖喉風

走馬牙疳

纏喉風

此四症皆凶險之症若不早治針之無血藥不能
凡俱為不治醫者慎之

右手圖

肺脉浮瀄而短
脾脉緩而散大
命脉緩而悠佯
三部之脉呼
吸四至爲平
反此則病



遲則寒。數則熱。細緩
則虛。寒。細數虛熱。
右手三部
寸屬肺與大腸
關屬脾與胃
尺屬命門三焦

左 手 圖

心脉悠洋緩

散

肝脉沉而弦

長

腎脉虛細宜大

則病四至為平反之




病脉同前

右手三部
寸屬心與小腸
關屬肝與膽
尺屬腎與膀胱

針穴圖

耳垂下八分
頰車

穴左右全



少商大指內甲角

中冲中指中節下

少冲小指內甲角

關冲

無名指內甲角

商陽食指外甲角

頰車穴 足陽明胃經

少商穴 手太陰肺經

商陽穴 手陽明大腸經

中冲穴 手厥陰心胞絡

關冲穴 手少陽三焦經

少冲穴 手少陰小腸經

凡六穴應病行

喉科指掌卷之二

雲間世醫張宗良留仙氏著 男源一初同校訂

精選應用諸方

漱咽喉七十二症總方六味湯

治一切咽喉不論紅白初起之時漱

服可愈

荊芥穗三錢

大薄荷

三錢要二刀香者妙

炒僵蠶二錢

桔梗二錢

生粉草二錢

防風二錢

右藥俱爲末煎數滾去渣溫好連連嗽下不可

大口氣吃完○如煎不得法服不得法則難

見效須依如此為度○倘要緊之時煎及白滾

水泡之亦可此乃總方看症之形名然加減他味後臨症可細查

雄黃退腫消痰藥此初起之症風痰上壅者吹之即退

銀硝一兩二錢 水飛過用 玄明粉 二錢 白礪砂 二錢

雄黃凡錢揀上好紅明大塊者

右俱為細末吹用○若傷者爛斑者恐大痛不

可輕用

金不換吹藥

治火症痘疳牙疳喉間潰爛者吹之甚妙

人中白

五錢煨存性用

細栢末

三錢

青黛

六錢

玄明粉

三錢

白礪砂

三錢

西瓜硝

八錢製法在後

冰片

三分

右爲細末吹用

若爛斑有深潭者加龍骨象皮赤石脂

各三錢

同研吹之

痘疳加川連胡連甘草人中黃銀

粉雪即補之每金不換重一錢五味各加五分

合搽之

喉癰 喉疳加 銀粉雪每錢 三分

爛喉八仙散 凡咽喉潰爛者服此藥

人中白 一兩煨存性用 生大黃 一兩二錢 生石膏 五錢

元參末 六錢鹽水炒 黃芩 一兩四錢酒炒 玄明粉 七錢

姜蚕末 三錢 瓜硝 八錢 輕粉 一錢

共九味研末每服二錢放舌上津化嚥下連連

不斷則爛斑自去矣

散痰珠黃散

治風痰上壅之症每服三錢

金星礞石

一兩五錢
全硝炒

生大黃

一兩五錢
錢末用

白礪砂

一兩

玄明粉

六錢

瓜硝

八錢

真川鬱金

六錢

海浮石

六錢

共研爲末用○若痰多者用五錢生大黃

送下如不然卽六味湯藥水送下亦可淡姜湯

亦妙

爛或腫俱屬脾火熱之症結毒者亦有之但兩關脈浮
者非結毒也沉者爲真此乃分經之大略若喉舌諸症另
後分形細查無謬

咽喉看治法總要 非十四

凡治毒症之法。須看其氣血壯盛者。多服涼藥。不妨如氣血衰弱者。涼藥不可多用。多則氣血愈衰。即用十八味神藥爲安。

凡治喉中紅腫者。須視或癰或蛾。認症不真。不可下他藥。先用六味湯一服。吹金不換。然後查清加減可也。切不可輕易加減。急者先針患處。出血亦可。

凡帝丁在咽喉當中。爲人一身之主宰。動刀針時。切宜防

靈保玉臨丹 治一切瘡疔兼毒喉

山茨菰 洗去毛淨末焙 文蛤 一名五倍子淨焙

射香 三錢 雄黃 五錢紅明 千金子 四兩淨去油

紅牙大戟 四兩五錢為淨末一兩 草河車 二兩五錢為淨末二兩

以上諸品共為細末擇天德月德天醫黃道吉

日或五月五日午時亦妙齋戒焚香潔淨用濃

米飲湯調和打成千餘下為度每服五六分甚

者一錢治病甚多可查外科正宗上乃見其神

效

結毒紫金丹

此方治楊梅瘡毒喉症唇鼻破壞并治一切結毒○服者必

須土茯苓湯送此藥下餘作茶○凡毒氣隨經絡而結恐喉間小舌皆能結聚故治咽喉者不可不知

龜板五兩炙焦浸酒漿肉再炙反覆炙之塗酒三次焦黃爲度卽研成細末淨二兩○龜自死爲敗大者更妙

石決明九孔者佳童便浸一次淨末二錢

朱砂大塊者佳淨末二錢

以上其研極細爛米飯搗爲丸小菰荳大每服錢
若病在上飯前食病在下飯後食○若滿身筋
骨痛用酒服○腐爛者土茯苓何首烏全煎服
其功勝于五寶散

製藥法

製西瓜煎

覓上號頭籐西瓜或一個或二個用稻柴墊好放在乾燥
厨內至立冬口將瓜蓋挖去腹中瀝取去七分皮上肉剝

三分用皮硝二斤或斤半看西瓜大小蓋好用線絡之懸向背陰屋簷下至冷凍之期其硝自飛出瓜皮外顏色如霜月刷帚輕輕拂下以盤盛之包好至三五日一取至春間將瓜肉所剩之硝安好候到立冬將新鮮瓜盛之再加半斤或一斤仍舊懸好皮外飛出取之如此二次中間之硝亦好不必再做可治喉癰喉疳諸火症潰爛者吹之止痛○外皮飛出者名銀粉雪其功可並紫雪

製人中黃

將大毛竹筒一個兩頭留節鑿一圓眼用大粉草不拘多少爲末細填滿爲度用生漆將眼針好刮去竹皮通身鑽滿細眼拋入大坑中十年正好六七年亦可用得能治結毒咽喉爛牙疳傷寒發斑俱稱聖藥

製篇栢汁

用栢葉嫩頭摘在井水內浸一次卽帶水撈入石臼中打爛若乾冲白礬水少許出汁收在磁器中用時再冲白礬湯連漱喉間能治一切火症鬱熱爛喉爛疳○其性涼血

潤燥清肝胃之火況得松栢之氣醫方珍之不可輕忽

製胆礬

用鱖魚胆不拘幾個和白礬拌之入猪尿胞內挂在背陰之所明年再入胆汁仍舊風干如此三次遇急症泡湯灌吐

采探應用諸方

知柏地黄湯 腎虛門

六味地黄湯加 知母 黃柏 各五錢

三黃湯 火症門

黃連 黃芩 黃柏 各鹽水炒錢半

三黃石膏湯 表裡門

三黃湯加 石膏 三山梔 錢半

犀角地黄湯 胃火門

六味地黃湯加犀角

錢二石膏錢四

涼膈散

外科正宗

連翹

錢一大黃

錢三芒硝

錢一甘草

錢一黑山梔

錢一五分黃芩

錢一五分

薄荷

錢一加竹葉

四物湯

血虛門

川芎

當歸

地黃

芍藥

各二錢

八味丸

腎虛門

六味地黃丸加

附子

肉桂

各三分命服

大承氣湯 傷寒門

大黃 錢五 芒硝 錢三 厚朴 錢半 枳實 錢半

黃連解毒湯 火症門

黃連 錢一 黑山梔 錢一 黃柏 錢半 黃芩 錢一

龍骨生肌散 外科門

龍骨 赤石脂 血衄 孩兒茶 象皮 硃砂

煅石膏

大柴胡湯 中風門

大黃 枳實 黃芩 半夏 白芍 柴胡
等分煎加姜

棗

萬靈丹
外科正宗查

喉科指掌卷之三

雲間世醫張宗良留仙氏著 男源一初全校訂

咽喉門第一 十一症

簾珠喉



簾珠喉滿喉如白網油狀兩邊微腫根有白點帶紅色小舌紅腫嚥水大痛○此症因鬱積熱毒而發其脈兩寸浮洪兩尺亦洪大上盛下虛之症也治宜清火用六味湯加鹽水炒黃栢二錢

酒炒黃芩二錢 鹽水炒知母二錢 磁石膏五錢 山豆根二錢

錢 鹽水炒玄參二錢 生山枝一錢 木通一錢 生地二錢 服

一帖明目再加 連喬二錢 紫地丁三錢 大熟地三錢 牡

丹皮一錢 草河車二錢 川連一錢 用金汁一鍾或製栢枝

汁一鍾冲服皆妙吹紫雪金不換六七日而愈

喉啞食噎



此症因伏邪在肺。聲啞噎食。六脉遲細。甚屬險症。○余曾治一人。年近二十。患此三年。飯食少進。只吃粥。病在將危。就醫于余。余診其脉。病雖常久。脉尚有根。或可治之。用六味湯加麻黃二錢。桂枝一錢。蘇葉二錢。木通一錢。細辛一錢。白芷一錢。訶子二錢。皂核二錢。薑汁炒半夏二錢。連吃五六日。飯進三碗。聲

亞未除換加

桔梗

一兩四錢半童便炒

訶子

七錢半童便炒

甘草

七錢半童

便炒薄荷一錢


麻黃

一錢童便炒

煎數滾嗽而且吃十帖乃愈後服

補藥健脾收功

內外科喉腫



此症生于關內下部陽陰相結內外皆腫或有爛斑火鬱之症用六味湯加

酒炒黃芩 三錢 熟大黃 五錢 海浮石 二

錢 吹紫雪金不換明日換加 丹皮 一


五分 生地 二錢 酒炒黃芩 二錢 生石膏

三錢 山梔 一錢 木通 一錢 卽針 少

商 商陽兩手四穴如背寒加羌活


胃泛加葛根栢枝汁亦可漱之

風熱喉



此症感風熱而起滿喉發細紅點根帶
淡白舌下雨邊三四塊六脉洪緊用六
味湯加二錢水炒元參二錢酒炒黃芩
二錢山枝一錢花粉一錢一服卽愈吹
金不換兼服八仙散

紫 色 虛 喉




喉間紫紅久之變爛如生漆色。因初起
 早服寒涼故也。此症肺中伏寒平而不
 腫飲食難進吐出腐肉者急治之。如見
 此症認爲火症反用三黃湯犀角羚羊
 角等藥吃成死症惜哉。余凡見紫色之
 症不論名式喉間絕無形跡滿喉皆紫
 脈緩身涼者用六味湯加細辛五分
 葛根一兩桑葉各二錢白芷川芎麻

黃各一錢 服後紫變爲紅 加鹽水炒元參二錢 酒炒

黃芩二錢 化粉一錢 卽愈

此症多因胃火旺發癰于喉不腫而微
 喉中不閉不腫微痛
 時飲食不進此保虛
 大淹腫難愈忌利


癰 喉



此症因胃虛火旺發癰于喉不腫而微
 紅上有班點青白不一如芥子大或環
 莖大每點生芒刺入水大痛喉乾聲啞
 咳嗽無痰六脉細軟都是用知柏地黃
 湯將四物湯加 麥冬 鹽水炒元參
 女貞 鹽水炒 枸杞 首烏
 阿膠 各二錢 等服十服後用八味丸加
 女貞 鹽水炒 枸杞 人參 洋參

俱塩水炒淡塩湯每早服四五錢如服前相知地黃湯四
物湯不應加桂附每帖各三分水煎冷服此引火
歸原之法也玄武膏亦可服如六脉洪數恐難脫體○
吹紫雪金不換

喉 疳



此症腎虛火旺沸騰上部而發喉間上
 腭有青白紅黑平坦無刺故名喉疳聲
 不啞不咳嗽兩尺脉虛者是也先用六
 味湯去荆防歪三味加 鹽水炒元參
 二錢 酒炒黃芩 二錢 丹皮 二錢 生地 二
 錢 山枝鹽水炒 二錢 鹽水炒女貞 一錢
 鹽水炒知母 一錢 男加龜板 五錢 女加
 鼈甲 五錢 服五劑或十劑如不愈再加

附子 三分 肉桂 二分 二味先煎冲前藥內冷服愈後食八

味尤加 塩水炒元參知母女貞枸杞一料全愈○吹金


不換

飛揚喉




此症風熱上壅上腭紅腫氣不能通嘔
 物不下從小舌中飛揚滿口此係凶惡
 之症急針患上出血泄氣吹金不換用
 六味湯加連翹葛根黃栢山
 枝木通各一錢生石膏四錢一二服
 愈

虛 啞 喉



虛啞喉喉間不腫兩邊關內少有紅點
 聲啞不明牙關不開此內火外風之症
 因喜食酸滯之物肺氣不清故也用六
 味湯加 細辛 三分 蘇葉 二錢 服一帖
 聲音不啞換加 生地 二錢 丹皮 二錢
 煎水炒山梔 一錢 木通 一錢 花粉 一錢
 再二帖而愈


喉 啞 聲



此症寒伏肺家。不腫不紅。又無爛點。惟覺乾痛。但食米粥。不能吃飯。用六味湯加蘇葉二錢。麻黃二錢。細辛五分。二服後。麻黃蘇葉各減一錢。再二日換加花粉一錢。黃芩一錢。菴活一錢。薑汁製半夏一錢。皂核二十粒。訶子二錢。半童便。桔梗五錢。半童便。甘草五錢。半童便。炒半生用。四

五帖。乃痊。○初起不可用涼藥。四月之症而愈。


爛 喉 沙



生在喉嚨地部
退後半寸

此症發于寒傷之後表邪未盡生在開
內腫爛右關脉急肺脾之毒可加六味
湯半服加酒炒黃芩二錢花粉一錢
煎水炒元參二錢葛根一錢生石膏二錢
五分淡竹葉二錢河車二錢五分連服
三四劑如爛班不退加生大黃三錢
津化八仙散玉樞丹每服五分三服可
收功

雙乳蛾




乳蛾門第一

七症

乳蛾其狀如肉筋致生于關上其生于關下者


此症感冒時邪而發生于關口上部兩
 邊如櫻桃大肺胃之症也身發寒熱六
 脉弦數先針少商商陽兩手或挑
 破患上出血亦妙先用六味湯加陳
 皮海浮石蘇葉羌活各錢兩服
 可愈如腫不退六脉有力可加大黃三錢

單乳蛾



此瘡因傷寒後發散未盡身熱惡心恐
 見癰疹六脉浮數生于雙蛾或傍或左
 或右用六味湯加蘇葉二錢羌活二
 錢鮮新元莖五錢如無新者用子三錢
 一服退半明日再加黃芩酒炒三錢
 花粉二錢山枝二錢赤芍二錢木通二
 錢全愈

蛾 乳 爛




此症因肺胃鬱熱紅腫爛斑大痛難于
 飲食六脉弦緊急針少商商陽左
 右四穴用六味頭加葛根二錢蘇葉
 一錢鹽水炒玄參一錢酒炒黃芩二錢
 冲栢枝汁一鍾漱喉間嚥下再用八仙
 散一服津化嚥之明口去蘇葛二味加
 山枝木通生地丹皮浮石
 花粉各三錢如脉大有力加生大

黃三錢 脉虛用八仙散全栢枝汁照前吃法三四日可愈


○如聲啞背寒六味湯加 蘇葉二錢 羌活二錢 細辛二錢

風寒蛾




此症因風寒而起。腫大如李。頭不能下。
視氣寒不通。寸關之脈浮緊。肺胃之症。
也。卽針。少商。商陽。少冲。兩手用
六味湯。加。蘇葉。二錢。羌活。二錢。一服。
而愈。若早用寒涼。則不能退矣。

白 色 喉 蛾



白色乳蛾腫塞滿口身發寒熱六脈浮
 弦此症因肺受風寒用六味湯加蘇
 葉二錢細辛三分羌活二錢一服即愈

石 蛾




此症或胎生或因本原不足生于乳蛾
 地位少進半寸初起切不用寒涼不
 必用刀針此乃用火老痰結成惡血凡
 遇辛苦風熱即發用六味湯加 川貝
 一錢 生地二錢 傍子一錢 丹皮一錢五
 麥冬一錢 木通一錢 煎服四五帖如不
 退去六味湯用 生地 錢半 丹皮 一錢
 象貝 錢二分 甘草一錢 牛傍一錢 桔梗

八分 麥冬一錢 木通六分 薄荷葉一錢 加燈心二分 煎服

以愈爲止○吹雄黃退腫藥

伏寒乳蛾



凡伏寒之症其色必紫治法同紫舌蛾
 腫即

喉科卷之三

喉蛾


三

凡遇孕婦喉癰用藥有碍將喉癰藥煎滾漱喉間吐去亦可全愈。

喉科指掌卷之四

雲間世醫張宗良留仙氏著 男源一初全校訂

喉痺門第三 七症



此症因肝胃熱毒外感時邪而發形如
花瓣爛腫白斑痛叫不食眼睛泛上六
脈洪大即針少商商陽關冲
少陰入穴有血則生無血者死用六味
湯加生大黃五錢 煎水燉元參二錢

酒炒黃芩

二錢

生地

二錢

丹皮

二錢

浮石

二錢

山枝

一錢

木通

一錢

兩服後去

大黃并

六味湯

再加

生石膏

三錢

河子

一錢

五分

栢子仁

二錢

同用


中製栢枝汁

半盃

四


服而愈口吹金不換兼服八仙散每日二錢津化嚥下○

雙喉痺




雙喉痺生于上腭關內兩傍形如橄欖
 痛而難食胃家積熱所致或發寒熱兩
 關洪大者是也即針患處或商陽穴
 針之亦可先用六味湯一服明日再加
 黃芩 酒炒 山枝 木通 元參 鹽水
 半錢再服而退○ 爛者不可針患上吹金
 不換

寒伏喉痺




此症肺經脈緩寒重色紫亦不太腫因服涼劑久之必爛凡遇此紫色不可作火治六味湯加細辛五分麻黃一錢桂枝一錢蘇葉一錢瓜蒌一錢訶子一錢牛傍一錢甚者或吐出紫血塊者亦如此吃法未爛者加蘇葉二錢細辛三分柴胡一錢海浮石錢半腫與不腫全治

白 色 喉 痹




此症因肺胃受寒。脈遲身熱。六味湯加
 細辛三分。羌活二錢。蘇葉二錢。陳皮一
 錢。二服可愈。或二服後變紅色乾痛。
 去前四味。換加山枝。木通。酒炒
 黃芩。生地。黃柏。各一錢。痰多加
 浮石。製半夏。天花粉。各一錢。

單喉痺



單喉痺或左或右治全前

淡紅喉痺




淡紅喉痺。腫如鷄子。飲食不下。身發寒。
熱。眼紅。嘔吐。恐有斑毒在內。急針少
商。少陰。商陽。關冲。左右或患上
挑破六味湯加蘇葉。菴活。葛根。
各二錢。鮮元菱。五錢。服一帖。滿身發出
痧疹。嘔吐即止。或身熱不退。喉外亦腫。
此內火外泄也。換加生大黃三錢。葛
根。黃芩。山梔。元參。花粉。各錢。

生石膏 五錢 滑石 二錢 木通 一錢 服二帖後去大黃石膏

再用前藥照方四五帖乃痊○有爛斑用八仙散一服津
化嚥下兼吃栢枝汁○此症因傷寒時邪未清之故○兩關
沉細兩尺寸四脉虛數是也

走馬喉痺



此係急症。肝脾火閉不通而為痺。或發寒熱。脈洪大者生。沉細者死。用六味湯加葛根二錢。柴胡一錢。細辛五分。再加角刺二錢。歸尾二錢。赤芍二錢。河車二錢。生大黃五錢。痰多加浮石三錢。製半夏二錢。身熱背寒加羌活一錢。蘇葉一錢。即針少商。商陽。關冲。兩穴。血多為妙。

喉風門第四

內腫鎖喉風



此症因肺胃兩經陰陽相結內塞不通

外無形跡喉間痰喘先服吐痰法見風

門嚕吐再用六味湯加麻黃二錢生

大黃五錢細辛一錢蘇葉二錢佳枝

錢菴活二錢煎數沸服之或瀉或吐為

如不吐瀉針少商商陽關冲

曲池合谷開手十穴有血則生

無血則死○左右寸關弦緊洪大者生○沉遲者難治○吹
黃消痰藥○

纏喉風

喉



纏喉風因肺感時邪風痰上壅陰陽閉
結內外不通如蛇纏頭關下壅塞甚者
角弓反張牙箝緊閉先用開關散吹皂
角刺錢一分細辛五分冰片二分共研細末吹入
鼻內再用針額車左右兩穴點艾數
壯牙關可開用鷄蛋白沖白礬湯灌
吐或用桐油蘸鷄毛吐之或用胆
礬法吐之以吐爲度如不吐卽針十指

五穴

少商 商陽 關

取血爲度無血難治

用六味湯加生

大黃

兩 蘇黃 錢二

羌活


錢二 蘇葉 錢二

訶子

錢二 全煎數沸嚥下或

瀉或吐皆爲大妙如不吐不瀉針之無血六脉沉細者不
治○吹胆攀消痰藥


風喉舌也



此症生于喉之上下兩旁近小舌小有
 泡或紅或紫外臉皆腫喉內不腫舌捲
 粗大此惡症也看治幾症好者甚少用
 六味湯加黃連一錢黃芩二錢大黃生
 四錢連翹二錢冲玉樞丹一錢急進三
 四服或有可生如牙關黑腫搖頭齒落
 者難治○此症乃肺肺積毒所致


虛 悶 喉 風

吹金不換服
八仙散



此症因本原不足虛火上炎生于喉之
關內上下紅色白班痛爛不腫六脈細
數者是也初起用六味湯加 鹽水炒
玄參 二錢 酒炒黃芩 二錢 鹽水炒山枝
一錢 花粉 一錢 生地 三錢 丹皮 二錢 連
進二服後去六味湯加 鹽水炒知母
黃柏 各錢 服五帖如雨悶沉大作結毒
治用藥照 毒門

白 色 喉 腫



紫色喉風全
此治法

此症因寒包火伏于肺經白而不腫者
有紅紫爛斑脈象不數身熱怕寒火欲
外發用六味湯加葛根二錢麻黃一
蘇葉一錢柴胡錢半細辛五分花粉錢
桂枝一錢羌活錢半服一二帖兼八仙
散一服化下變紅色換加元參鹽水
錢黃芩酒炒山枝一錢木通一錢一帖
可愈

酒毒喉風


吹金鎖匙退
腫可也



此症因醕酒厚味生于關內紅腫痰名
嘔物不下肺脉獨遲兩關皆大用六味
湯加 生甘草 一兩 葛根 一錢 浮石 二
錢 枳棋子 二錢 花粉 二錢 山枝 一錢 明
日再加 鹽水炒元參 生地 丹皮
各二 四帖而愈

勞碌喉風

吹金不換



此症肝腎兩虛發于關內滿喉少有紅
 點根白不腫常有血腥氣勞碌即發六
 味湯加 鹽水炒元參一錢 鹽水炒知
 母二錢 生地二錢 丹皮 木通 各一錢
 明日再加 連翹二錢 酒炒黃芩二錢
 花粉二錢 山枝 鹽水炒一錢 再兩日後
 去六味湯換煎方 鹽水炒元參二錢
 女貞錢半 生地錢半 麥冬一錢 酒炒黃
 芩一錢 酒炒黃

芩一錢

丹皮

二錢

枸杞

一錢

龜板

二錢

生首烏

五錢


生廿

草一錢

再兩帖而愈○其脈象六部數而中空者此爲吼

脈是也


酒寒喉風



酒寒喉風。因酒後遇寒。關內兩邊平而
 不腫。有淡紅塊。叫五粒。嚥物覺痛。身無
 寒熱。六脈洪大。用六味湯加 花粉二
 錢 枳椇子 二錢 黃芩 酒炒二錢 乾葛一
 錢 一二服而愈。


腫爛喉風

吹金不換藥



此症因風火內熾，腫爛門初，脈洪，用六味湯加葛根、花粉，各一錢，如紅爛，不遇藥不能入，再用六味湯加淡豆豉、木通、山枝、鹽水炒知母，各一錢。花粉、當歸、柏子仁，各錢半。丹皮二錢。生地錢半。浮石三錢。連服二帖，兼用柏枝汁一鍾，沖藥嗽之，六劑乃安。


肺寒喉風



此症因肺受重寒生在關內下部兩邊
 如扁豆殼樣右寸關弦緊平而不腫大
 痛難食不穿不爛背寒怕冷六味湯加
 菴活 蘇葉 各二錢 當歸 柴胡
 牛傍 桂枝 各一錢 細辛 五分 二服而
 痊

辛 苦 喉 風

吹金不換藥



此症因日夜辛苦而發不腫紅痛小舌
左右常出血上部之脉洪緊用六味湯


加 鹽水炒元參 酒炒黃芩 各二錢

山枝一錢 木通一錢 連翹二錢 火重者

加 生地二錢 鹽水炒知母二錢 丹皮

一錢 澤瀉一錢 花粉一錢 二三帖全愈

風喉紅淡



此症肺脾感冒風邪而發腫連小舌喉
塞不通聲音不清右手關脉 針少

商關少冲 關冲 兩手 急者患上亦可

挑破用六味湯加 龜活 蘇葉 葛


根各二錢 一服而退

喉科指掌卷之五

雲間世醫張宗良留仙氏著 男源一初全校訂

喉癰門第五 十一症

伏寒喉癰



伏寒喉癰因積寒在內外感時邪而發

其色紅腫紫色脈浮不數六味湯加

羌活 葛根 河車 山甲 赤芍


歸尾 各二錢 角刺 蘇葉 木通 各一

錢 細辛 三分 兩日後加 山枝 一錢 去

龍葛二味餘藥照前四五日而愈

腫爛喉嚨

吹金不損藥



此症脾家積熱而生紅腫潰爛兩寸關
脈洪大都是也針少商商陽關

冲少冲兩手血多為如先服八仙散

放于舌上再川六味湯加鹽水炒元


參二錢煎水炒黃柏一錢酒炒黃芩錢

半生大黃三錢山枝木通各一錢河

車二錢如一服後瀉過可去大黃三日


後用十八味神藥栢枝汁嚙漱即愈

淡白喉癰




此症因脾肺受寒其色不紅若用寒涼
之劑七日之內必成膿潰有膿即用針
挑破患處○初起腫針 少商 商陽
兩手 出其紫血六味湯加 蘇葉 赤
芍 歸尾 各錢半 一服後明日再加
山甲 角刺 河車 各二錢 乃愈六脉
弦緊身發寒熱者是也

大紅喉癰




此症因肺脾積熱其色鮮紅腫脹閉內
 六脉洪大身發寒熱急針少商商
 陽或針患上腫處出惡血用六味
 湯加山枝木通各一錢浮石生大
 黃各三錢歸尾角刺山甲河車各
 錢黃芩花粉赤芍各錢半用河水將
 加藥十一味先煎二三十沸後下六味
 頭同煎數滾即起二帖可愈

聲啞喉癰



此症因着寒太重肺膈閉塞以致聲啞
 湯水難入或有爛斑肺脉沉瀉脾胃脉
 洪大背寒身熱用六味湯加 羌活二錢
 葛根 蘇葉各一錢 一服漱之二
 日後聲音不啞去前三味換加 花粉
 一錢 乳香 五分 葛根 黃芩酒炒 歸尾
 赤芍 山甲 角刺各二錢 再服八仙散
 玉樞丹二帖全愈


單 喉 癰



單喉癰或左或右身熱背寒腮肺之症
 也有紅點者風火無紅點者風寒脉象
 如前六味湯加 蘇葉 羌活 各二錢
 漱一服明日再加 赤芍 歸尾 荳
 根 山梔 各錢半 服一帖即愈

外症

喉癰




此症生于含下天突穴之上內外皆腫
 飲食有碍初起無痰涎內不見形跡此
 風毒喉癰也六味湯加黃芪角刺
 山甲歸尾赤芍河車各二錢紅
 花葛根各一錢乳香五分連進三服
 以消爲止如已成出膿必成漏管用十
 全大補湯收功

癰腮喉癰




此症生于腮下其名懸癰因鬱積寒氣而發外用艾炙之法二壯用六味湯加山甲 歸尾 角刺 川芎 白芷 各一錢 升麻 三分 紅花 乳香 各五分以消爲度有膿卽針之成漏者多用 參耆內托或可收功遇症不可輕忽

舌上癰




舌上癰生于舌中心如梅子大不能言
語此症因熱入心胞絡而發左寸脉宜
洪大而數不宜細緩形症紅腫者可治
黑者不治用六味湯加 川連 二錢 連
翹 五錢 河車 五錢 生大黃 四錢 地丁 三
錢 吹金不換重加瓜硝搽之或加 牛黃
三二分 更妙以愈爲度

舌下痛



此乃脾腎積熱故發症于舌下。然舌下
金津玉液二穴通于腎經。腎水枯竭生
于此穴。胗其左尺洪數者是也。用六味
湯加 生地 二錢 河車 二錢 葛根 一錢
丹皮 一錢 花粉 一錢 玄參 三錢 二服後
用十八味神藥收功。吹藥如前。

上 腭 癰



上腭癰高如梅核。挂下不能飲食。此症因胃家火燔之毒積久而發。用宜解毒之劑。草河車三錢。石膏五錢。地丁生地各二錢。歸尾赤芍山甲角刺各錢半。丹皮花粉葛根各一錢。服四五帖。或十帖。兼用玉樞丹每日服五分。吹紫雪金不換。○此症非小二三日收功者亦有之。

舌 木



○大舌門第六十三症

此症心脾肝三臟積熱而發舌粗紫脹
食滯中宮不能言語因多食炙炒所致
急破出紫血搽金不換服大承氣湯兼
黃連解毒湯加山枝木通連翹
花粉各二錢赤芍草河車各三錢
服二帖不應重加生大黃以瀉熱毒
再用六味湯嗽口不必下○左右寸關之

脈俱洪大者○節症宜用前藥六脈細者○虛症難治○大承

氣湯 黃連解毒湯

俱在二卷精選
應用方內可查


白 腫 舌



此症因風寒鬱積于內六脉弦緊舌腫
 硬痛先用六味湯加 細辛 三分 蘇葉
 一錢五 白芷 一錢 當歸 一錢五 川芎 一
 分 葛根 一錢 若白胎上有黑點而滑者用
 淡附子 乾薑 各五分 煎服再服
 乾薑 冰片 射香 青皮 各分 共爲
 細末時擦舌上卽愈

爛 邊 疳

珠金不換藥



此症脾家濕熱不清大舌四邊發疳白

點而爛用六味湯加一小生地二錢消

石三錢淡竹葉一錢慈仁米一錢五分


猪苓一錢五澤瀉一錢車前一錢甘草

稍一錢二服而愈○口唇牙內爛腫同

此治法

紅點紫舌


搽金不換藥



此症因心脾二經熱極所致。滿口紅點
紫色作爛而痛。或身有赤斑。用六味湯
加熟石膏一兩 葛根一錢五分 川連一
錢 青黛一錢 黃芩酒炒二錢 黃柏一錢
木通一錢 山梔一錢 甚者加大黃三錢
如六脈不數者不照此方


純紫舌

紫藥如前




此症因傷寒用蔥酒發汗酒毒入心以致大舌純紫。宜用升麻一錢葛根一錢枳椇子二錢石膏一錢川連一錢五分滑石三錢不通一錢人中黃三錢如心煩不安加山枝一錢淡豆豉一錢惡心欲吐者恐防發斑加元菱一兩外用元菱冲燒酒揩背心爲妙

座蓮花舌




此症因脾家熱毒積久而發生于牙根
 內面走竄如蓮花一座患上卽針出血
 擦金不換藥再針兩手商陽穴用六
 味湯加河車二錢歸尾一錢赤芍一
 錢黃連一錢連翹一錢大黃三錢山枝
 一錢木通一錢生地二錢山甲一錢石
 膏生者五連服二服如不退用十八味
 神藥收功

重舌




重舌者大舌之下又生一小舌以致大舌反粗短小舌長痛此心脾之毒也左寸右關兩部之脈洪大者是久之必爛爛則難痊初起卽針出惡血搽金不換重加銀粉霜服黃連解毒湯加生大黃五錢如渴之五六次卽服玉樞丹十八味神藥亦可服

蓮花舌




此症心胃之火飛騰舌底卽針小舌放
出血吹金不換用三黃石膏湯再加
甘草五分河車二錢針商陽穴卽愈

黃 焦 舌




此症因嗜酒太多。遇寒而起。大舌乾黃。
用三黃湯加 枳椇 生石膏 人中
黃 身發寒熱用 大柴胡湯加
羌活一分 五 治之如嘔噦心煩脈象洪
大加 生大黃四錢 佐以 牛傍 赤
芍 乾葛 之類再無不應。

舌上珠



此症因心脾積熱舌生白泡大小不一
六脉洪大急挑破出血搽金不換服三
黃湯加石膏五錢河車二錢地丁草
一錢兼服玉樞丹五分一服如六脉遲
細者不可用煎藥

舌下珠




舌下珠因脾胃兩虛之症六味湯加

鹽水炒元參 生地 鹽水炒知母

黃柏 木通 等分治之抹金不換餘


藥照前

左 雀 舌



左雀舌因多食煎炒炙博之物所以積熱滯于胃故發于舌之傍生一小舌相近牙根初起將針挑破以去其血吹金不換六味湯加三黃湯涼膈散治之如久之必爛用龍骨生肌散收功
三黃湯○涼膈散○龍骨生肌散三方俱第二卷查用

右 雀 舌



喉科指掌卷之五

終

此症起亦積毒治法于前大同小異用

六味湯加 犀角地黃湯治之


○犀角地黃湯在第二卷查用
藥同前

喉科指掌卷之六

雲間世醫張宗良留仙氏著 男源一初全校訂

小舌門第七 五症


胃火小舌



此症因脾家火毒鬱久而發小舌白點
爛胃脉浮洪治用六味湯加 生石膏
四兩 酒炒黃芩 二錢 花粉 三錢 葛根 二
錢 山枝 一錢 一二服無有不愈 吹金
不換藥兼服栢枝汁法 此乃多食炙


煇醋酒厚味或魚骨刺傷非結毒之北也惟胗脉之時胃
部浮洪者火疔沉實者毒須明辨之

胃毒小舌




此症因毒結胃家。發于小舌。形如前症。胃脈沉而洪大者。真結毒也。臨症者不可忽之。亦有紅腫爛者。治法亦同。用十八味神藥全玉樞丹。每日一錢。土茯苓。每日用四兩煎湯代水。多吃爲貴。服一月後。如不愈合。結毒紫金丹一料。冲玉樞丹全服。亦用土茯苓湯送下。早晚各三錢收功。

橫熱小舌



此症因肝胃二經火毒飛騰所以小舌
 長硬白衣裹滿。嚥物不下。右關之脈浮
 大者也。用六味湯加 山枝一錢 連喬
 二錢 酒炒黃芩二錢 黃柏錢八分 生石
 膏三錢 滑石二錢 赤芍一錢 葛根一錢
 木通一錢 河車二錢 吹金不換後服玉
 樞丹二三服無有不愈

純白小舌



此症因胃家積毒。小舌忽變白色。軟大
 而痛。右關之脈洪沉。先用玉樞丹每服
 七分十服。或五服再用土茯苓煎湯代
 水。後用廣瘡藥二十一服。銀花湯送下。
 ○如胃脈不沉反浮洪者。作火症治。用
 六味湯加 生石膏 三錢 酒炒黃芩 三
 錢 山枝 一錢 車前子 二錢 木通 一錢 滑
 石 二錢 葛根 二錢 二 天花粉 一錢 五山

豆根

分二錢二

二三服


○即此一症兩治之法也

臨症必詳

脈理

然後下藥為安


懸旗小舌



懸旗風生于小舌下垂尖頭變員粗如
 柱圓核大紅如櫻桃此因多食厚味燥
 酒以致胃火鬱盛而發用六味湯加
 甘草五錢枳椇子二錢赤芍一錢一分河車
 二錢二服乃痊或腫處出血吹金不換
 亦好○胃脈浮洪者是

雜喉門第八 七症


松子疔



松子疔生于閤內小舌兩傍。或左或右。形如松子。淡紅而硬。大痛艱食。背寒身熱。兩寸閃脉。緊盛乃風火鬱積之症也。用吹喉湯加蘇葉。羌活。赤芍。連翹。山甲。河車。各二錢。明日去羌活。蘇葉。二味再加乳香。三分。玉樞丹一錢。研細藥水沖服。二日而愈。

吹金不換藥亦已

走馬牙疳



此症因脾胃積受熱毒太重初起牙肉
 先腫日久腐爛此為急症齒落肉黑者
 不治脈浮洪者生沉細者死如脈大有
 加尚可用神效之脈連虛邪藥石難
 挽故臨症須詳脈治之初起水腫者
 即針腫處出血擦金不換已爛者不必
 行針搽藥照上用川連 葛根 連
 翹 犀角 生地 各二 白鮮皮 甘草

象貝母

天花粉

各錢半

生石膏

一兩

草河車

一兩

入大

鍋內煎服三四碗連服三劑如脈數便結加

生大黃


錢五

生石膏

一兩


或者不救遲則不治

單 喉




此症因肝風鬱熱動氣而生。閃口上部。下垂根大頭小。紅色。大痛。先針兩邊。患上出血。吹金不換。漱茶。茶湯。一服。明日加柴胡。勾藤。赤芍。生地。丹皮。河車。各二錢。連喬。黃芩。酒炒。黃連。各錢。多煎數滾。服即愈。

菌 喉




此症因胎毒所致或因心胃火邪生于
喉內如菌樣故名喉菌不可用刀針服
黃連解毒湯玉樞丹可使其不發然
未見全退者

喉 癰 症



此症因惱怒傷肝或迎風高叫或本原
不足或誦讀太急以致氣血相凝生于
關內不時而發治以
樞丹地黃丸俱可
加難許速疥外吹

義 喉 痛



症
同

如
前

名曰癰故法同